


Navlebrok – Hernie umbilicalis

Navlebrok er en godartet sygdom som opstår, når bughinden presser sig ud gennem et svagt sted omkring navlen.



Forberedelse

Du skal ikke være fastende. Indtag gerne et let morgenmåltid og drik frit sukkerholdige drikke.

Tag din faste medicin. Dog ikke blodfortyndende.

Kontakt venligst klinikken, hvis du tager blodfortyndende medicin.

Lad være med at smøre creme på huden på operationsdagen. Det kan også være en god idé at tage løstsiddende bukser på den dag.

Bedøvelsen

Operationen foretages i lokalbedøvelse af operationsområdet. Du vil endvidere få anlagt et venflon/drop i hånden, så vi kan give dig lidt beroligende og smertestillende medicin under indgrebet.

Operationen

Ved operationen lægges et 3-5 cm langt hudsnit over brokket. Efter at brokket er skubbet på plads lukkes defekten i senen med 2 lag suturer (tråde). Selve operationen tager ca. 1 time.

Efter operationen

Sæt ca. ½ time af til observation på klinikken.

Der kan (sjældent) være nedsat kraft i benet samme dag,

Grundet den beroligende medicin må du ikke køre bil resten af dagen. Du bedes derfor sørge for transporten hjem, enten i form af pårørende, taxa eller Falck.

Arbejdet kan genoptages, så snart du har lyst (typisk 1-2 dage efter operationen). Ved tungt arbejde kan længerevarende sygemelding være nødvendig.

Efter hjemkomsten

Bevæg dig gerne lidt omkring men undgå voldsom aktivitet som sport og cykling det første døgn.

Undgå også alkohol det første døgn, da det kan øge blødningstendensen. Det kan være en hjælp at installere et trækreb i sengens fodende. Brusebad må tages dagen efter operationen. En våd forbindelse skal skiftes.

Efter operationen fortsat:

Der vil blive lagt bandage rundt om maven/navlen for at formindske sivning fra såret. Bandagen kan tages af senere på aftenen. Plastret skal forblive på såret, så længe det siver.

I de første 2-4 timer efter operationen mærker man som regel ikke så meget til operationen grundet lokalbedøvelsen.

Efter 4 timer kan man mærke lidt smerter svarende til såret. En recept på smertestillende sendes elektronisk til apoteket, som kan hentes før operationen.

I nogle uger kan området være hævet og misfarvet.

Bevæg dig gerne lidt omkring, men undgå voldsom aktivitet som sport og cykling og tunge løft.

Mulige komplikationer:

Alvorlige komplikationer til brokkirurgi er sjældne.

Hyppigst ses blødning. En mindre sivblødning kan ofte stoppes ved at presse et rent lommetørklæde fast mod såret i 10 min. Mindre gennemsivning af bandagen er ligeledes uden betydning. Våde forbindinger skal altid skiftes. Du får nogle plastrer med hjem.

Trådfjernelse

Trådene fjernes 7-10 dage efter operationen. Dette er ikke forbundet med ubehag.

Forsikringsspørgsmål

Vær opmærksom på at der kan gælde særlige forsikrings betingelser hvis du rejser med et brok eller er nyopereret. Planlægger du udlandsrejse er det en god ide forud for afrejse at orientere SOS (telefon: 7010 5055 mellem 9-16) som varetager Sygesikringens udlandsforpligtelser.

Kontakt

Du bedes venligst kontakte klinikken dagen efter indgrebet på klinikkens telefon **20 76 02 36**, så vi kan høre om hvordan det går dig derhjemme.

Er der øvrige spørgsmål, ring da til klinikken - **20 76 02 36** –mandag til torsdag klokken 18-19. Eller benyt e-mail **mail@kirurgilolland.dk**